



CRITÈRES DE SUSPICION

- Fièvre > 37.3°C en axillaire
- Douleurs musculaires
- Symptômes respiratoires: dyspnée – toux – crachats – rhinorrhée – mal de gorge – anosmie et agueusie brutales
- Symptômes atypiques pouvant précéder de 3 à 5 jours la fièvre et la toux :
 - vomissements – diarrhées
 - chutes inhabituelles
 - syndrome confusionnel aigu
 - symptomatologie labile (tantôt des troubles hémodynamiques majeurs avec marbrures et hypotension sévère, puis retour à un état normal avant une récurrence ; tantôt une hyperthermie importante tantôt une hypothermie)



Score de fragilité clinique (CFS)

AVANT LA MALADIE ACTUELLE

- 1-3: Actif, autonome pour les activités journalières, statut médical stable
- 4 -5: autonome mais fatigue, lenteur, ne sort plus
- 6: Aide partielle pour habillage et toilette
- 7: dépendant pour habillage/toilette/transfert/repas mais stable cliniquement**
- 8-9: déclin fonctionnel notable, grabataire, fin de vie proche (< 6 mois)



SIGNES DE GRAVITÉ

- Niveau de conscience altéré
- Fréquence respiratoire > 25/min
- Saturation < 93% si pas BPCO
- Pouls > 100/min
- TA < 100mmHg


PLAN DE SOINS PERSONNALISÉS ANTICIPÉS / DEMARCHE ÉTHIQUE / PROJET THÉRAPEUTIQUE ?

OUI

NON

PRISE EN CHARGE DU PATIENT SELON PROJET THÉRAPEUTIQUE. SI DOUTE SUR LA PRISE EN CHARGE, ADAPTER SELON L'ÉTAT DE FRAGILITÉ.

PROJET THÉRAPEUTIQUE **À RÉALISER SANS DÉLAI.** DANS L'ATTENTE, PRISE EN CHARGE SELON L'ÉTAT DE FRAGILITÉ.



A partir de l'ÉTAT DE FRAGILITÉ CLINIQUE avant la maladie actuelle (score CFS)

CFS 1-6



CFS 7



CFS 8-9



SIGNES DE GRAVITÉ

Si 0-1 signe de gravité

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE, AU SEIN DE LA MR/MRS

- Antibiothérapie à discuter
- Traitement symptomatique s'il n'altère pas le confort
- **Pas de nébulisation**
- Oxygénothérapie lunettes nasales 3L/min (si sat <93% chez non BPCO).
- Bonne hydratation

RÉ-ÉVALUATION à 48H ou en fonction de l'ÉVOLUTION

Si ≥ 2 signes de gravité

En fonction des directives anticipées et du projet thérapeutique

HOSPITALISATION en coordination avec les **URGENCES/GERIATRIE**

SOINS de CONFORT et PALLIATIFS si nécessaire **AU SEIN DE LA MR/MRS (*)**

(*) Pour un soutien dans la gestion des symptômes inconfortables : www.palliaguide.be

Mesures en cas de suspicion de COVID-19 en MRS : [iriscare-brussels](http://iriscare-brussels.be) et AVIQ

RCP non indiqué dans le contexte de COVID
Bénéfice faible et risque de contamination élevé